லிம்ப்ட் (புச்சிக்கொல்லி) அசிடாமிபிரிட் 20% எஸ்பி

அசிடாமிபிரிட் 20% எஸ்பி, ஒரு கரையும் பவுடர் தயாரிப்பு. இதில் அசிடாமிபிரிட் கொண்டுள்ள பருத்திப்பொருளின் 20% அடங்கியுள்ளது. அசிடாமிபிரிட் 20% எஸ்பி அதிக ஆற்றலுள்ள ஊடுருவிச் செயல்படும் புச்சிக்கொல்லி. இது பருத்தியில் அந்துப் புச்சிக்கள், ஜஸிட்டைன் மற்றும் வெள்ளை ஈ, மூட்டைக்கோகோல் பயிரில் அந்துப் புச்சிக்கள், வெண்டை பயிரில் அந்துப் புச்சிக்கள், மிளகாய்ல் திரிப்சைன், நெற்பயிரில் புகையான் புச்சிக்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

பரிந்துரைகள் : கீழே கொடுக்கப்படுகிறபடி பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றி பயன்படுத்தும் போது, அசிடாமிபிரிட் 20% எஸ்பி, பருத்திப் பயிரில் அகலவிளைச், தத்தும்புச்சிகள் மற்றும் வெள்ளை ஈக்கள், மிளகாய் பயிரில் திரிப்சைன், நெற்பயிரில் புகையான், மூட்டைக்கோக மற்றும் வெண்டை,கொய்வ அகலவிளைகளைக் கட்டுப்படுத்தும். அதிக கொள்ளளவு தெளிப்பொருளாக அசிடாமிபிரிட் 20% எஸ்பி, பருத்திப் பயிரில் அகலவிளைகளை கட்டுப்படுத்தும் போது தேவையான அளவு தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். குறைந்த அளவு மருந்து தெளிப்பொருளை மோட்டாரில் பொருத்தப்பட்ட பனித்துளி தெளிப்பானைப் இடைப் பயன்படுத்தலாம்.

பயிர் (கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர்			காலத்திற்கு அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருப்புக் காலம் (நாட்களில்)
		தீ.மு. (கிராம்)	தயாரிப்பு (கிராம்)	நீர் அளவு (லிட்டர்)	
பருத்தி	அந்துப் புச்சிகள், ஜஸிட்டன், வெள்ளை ஈ	10 20	50 100	500-600	15
மூட்டைக் கோஸ்	அந்துப் புச்சிகள்	15	75	500-600	7
வெண்டை	அந்துப் புச்சிகள்	15	75	500-600	3
மிளகாய்	திரிப்சைன்	10-20	50-100	500-600	3
நெல்	புகையான் புச்சி	10-20	50-100	500-600	7

பயன்படுத்தத் வழிமுறை: நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் பேட்டரிதெளிப்பான் மற்றும் அல்ட்-எச்பி வகை தெளிப்பான்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவு வகைகள், உணவு வைக்கப்படும் இடம் மற்றும் கால்நடைகள், காய்கறி தீவனங்கள், பொறைஞர்நிலிருந்து தூரத்தில் வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் உடலில், தோல்களில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. மருந்தின் தெளிப்பு புகையை உறிஞ்சுவதைத் தவிர்க்கவும். மருந்தை காற்றடிக்கும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. மருந்து தெளித்த பிறகு மருந்து வைத்துவிட்ட ஆடை,கலன்கள், உபயோகிக்கப்பட்ட பாக்கங்களையும் கத்தமாக கழுவவும். 5. மருந்து தெளித்தப்பொது புகை பிடித்தல், தண்ணீர் அருந்துவது, உணவு உண்பது, சுண்ணப்பது கூடாது. 6. மருந்து கலக்கும் பொழுதும், தெளிக்கும் பொழுதும் உடலை மூடிவைத்துள்ள வகைத்தகுதியான கவச உடை அணிந்து கொள்ளவும்.

பயிர் நற்கத்தன்மை: தேவைக்குத் தகுந்தமாறு உயிரினங்கிருப்பொழுது இந்த மருந்தினால் பயிரில் எந்த பாதிப்பும் உண்டாவதில்லை.

விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்: குமட்டல், வாந்தி, தலைவலி, கிறக்கம் மற்றும் வலிற்றுவலி ஏற்படலாம்.

முதல் உதவி: 1. மருந்தை விழுங்கிவிருந்தால் தொண்டையின் கீழ்ப்பகுதியில் கூச்ச உணர்வைத் தூண்டி வாந்திஎடுக்கச் செய்யவும் வாந்திக்கு நீர்மம் தெளியாதும் வரை வாந்திஎடுத்த தூண்டவும். பாதிக்கப்பட்டவர் மயக்க நிலையில் இருந்தால், வாந்திஎடுத்த தூண்டாதீர்கள். 2. உடை மற்றும் உடல் பாகத்தில் மருந்து பட்டிருந்தால் உடைமயக் களைந்துவிட்டு கழுவவேண்டும். 3. உடல் கழுவி பயன்படுவதால் 5லிட்/கிலோ மிக்கோ 10 நிமிடம் 15 நிமிடங்கள் மிக்கோ சுரக்க வேண்டும். 4. உடல் கழுவி பயன்படுவதால் 5லிட்/கிலோ மிக்கோ 10 நிமிடம் 15 நிமிடங்கள் மிக்கோ சுரக்க வேண்டும். 5. மருந்தினால் கண்ணில் ஏற்பட்டால் ஏராளமான தண்ணீரால் கண்ணை உப்பு கலந்த தண்ணீரில் கழுவவும். 6. மருந்து கலக்கும் பொழுதும், தெளிக்கும் பொழுதும் உடலை மூடிவைத்துள்ள வகைத்தகுதியான கவச உடை அணிந்து கொள்ளவும்.

**மருந்தாகாம