Powered by
IndoLife® Super Specialities

OXYFLUORFEN 23.5% EC
OVERTAKE®
HERBICIDE

ओक्सिफ्लोरफेन २३.५% ई सी
ओव्हरटेक
खरपतवारनाशक

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Factory :
Unit H - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat
Unit SS - C/o S. S. Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023

फैक्टरी :
युनिट एच- प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि.- पंचमहाल – ३८९३५०, गुजरात
युनिट एस एस- C/o एस. एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

Manufactured & Marketed by :
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059



08.22

OXYFLUORFEN 23.5% EC

OVERTAKE® (HERBICIDE)

Overtake 23.5% EC is a selective herbicide containing Oxyfluorfen active ingredient 23.5% w/w, balance emulsifier and solvents. It has a residual activity and controls important weeds in Rice, Tea, Potato, Onion and Groundnut.

Recommended use:

Crops	Name of weed/s	Dosage per Hectars			Time of Application	Interval Between last Application & Harvest
		A.I. (gms)	Formulation (ml)	Water (Lts.)		
Rice (Direct sown As pre-Emergence)	*Echinochloa Sp., Cyperus iria, Eclipta alba*	150 to 240	650 to 1000	500	Apply within 4 days after transplanting	15 Days
Tea	*Digitaria, Imperata, Paspalum, Borreria Hispida*	150 to 250	650 to 1000	500 to 750	Blanket application on the soil between the row pre emergence of weeds.	
Potato	*Chenopodium, Coronopus, Cyperus Heliotropium, Trianthema*	100 to 200	425 to 850	500 to 750	Blanket application on the soil between the row pre emergence of weeds.	
Onion	*Chenopodium, Amaranthus viridis*	100 to 200	425 to 850	500 to 750	-do-	
Groundnut	*Echinochloa colonum, Digitaria arginata*	100 to 200	425 to 850	500 to 750	Blanket application on the soil between the row pre emergence of weeds.	

Equipment:
Hand operated knapsack sprayer with a floodjet or flat fan nozzle is recommended. Tractor mounted sprayer can also be used.

Symptoms of Poisoning:
Combination or any of the symptoms may be noticed *viz.;* Headache, Nausea, Skin and Eye irritation in case of direct contact.

First Aid:
If skin is contaminated; wash well with soap and plenty of water, if eyes are contaminated; Flush with clean water.

Antidote:
Symptomatic. If swallowed, a gastric lavage with warm water be given followed by administration of mixture containing activated Charcoal 2 parts, Magnesium Oxide 1 part and Tannic acid 1 part in 300 ml. warm water.

Storage:
1. The packages containing weedicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the weedicide.
2. The room or the premises meant for storing the weedicide shall be well built, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with water.

Disposal of empty container:
1. The package shall be broken and buried away from the habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their misuse.
3. Packages or Surplus material and washings should be disposed of in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Composition : Oxyfluorfen Technical (70% a.i.) to make 23.5% EC : 33.60% w/w, Xylene : 42.80 % w/w, Cyclohexanone : 13.40% w/w, Emulsified blend (calcium dodecyl) - benzene sulfonate, OPE-70, IF-100 and Tergiton XD : 10.20% w/w, **Total 100.00% w/w.**

ENG

ओक्सिफ्लोरफेन २३.५% ई सी

ओव्हरटेक (खरपतवारनाशक)

ओव्हरटेक २३.५% ई सी एक चुनिन्दा खरपतवारनाशक है। जिसमे ओक्सिफ्लोरफेन सक्रिय तत्व २३.५% भार/भार, बाकी द्रावक और इमलसिफायर इसमे शेष क्रिया है। यह धान, चाय, आलू, प्याज और मुंगफली मे आनेवाली खरपतवारों का रोकथाम करता है।

उपयोग की मात्रा:

फसल	खरपतवार के सामान्य नाम	प्रति हेक्टर छिड़काव की मात्रा			प्रयोग करने का समय	आखरी छिड़काव और काटई के बीच का अंतर (दिनों में)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (मि.लि.)	पानी (लि.)		
धान (सिधे बुआई अंकुरण से पहले)	संवा, मोथा, भांगरा	१५० से २४०	६५० से १०००	५००	पौधे रोपने के ४ दिन के अन्दर प्रयोग करें	१५ दिन
चाय	मकरजुली, सिरहु, कोदो, मदनघंटी	१५० से २५०	६५० से १०००	५०० से ७५०	खाली छिड़काव खरपतवार उगने से पहले कतारों के बीच छिड़काव करें	
आलू	बथूआ, जंगली हाला, हड्डा सुरा, मोथा, पत्थर चट्टा	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	खाली छिड़काव खरपतवार उगने से पहले कतारों के बीच छिड़काव करें	
प्याज	बथूआ, जंगली-चौलाई	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	खाली छिड़काव खरपतवार उगने से पहले कतारों के बीच छिड़काव करें	
मुंगफली	संवा, मकरजुली	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	खाली छिड़काव खरपतवार उगने से पहले कतारों के बीच छिड़काव करें	

कृषि छिड़काव यंत्र :
फ्लड जेट या फ्लैट फॅन नोज़ल लगाये हुए हाथ से चलाए नैपसैक स्प्रेयर का उपयोग करें। ट्रैक्टर पर बिठाये हुए स्प्रेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

विष बाधे के लक्षण :
कोई एक लक्षण या साथ में अनेक लक्षण दिखाई दे सकते है। जैसे सरदर्द, चक्कर, चमड़ी और आँख में लग जाने से, जलन भी हो सकती है।

प्रथमोपचार :
दवा लगी त्वचा को भरपूर पानी और साबुन से धोइये। आँखों में लग जाने से जलन भी हो सकती हैं। आँखो में जाने पर स्वच्छ पानी से धोईये।

विष निवारण :
चिकित्सानुकुल। पेट में निगल जाने पर थोड़ा गरम पानी से लव्हेज दिजिये। इसके बाद यह मिश्रण जिसमें एक्टिवेटेड कोयला २ भाग, मैगनिशियम ओक्साइड १ भाग, और टैनिक एसिड १ भाग, ३०० मि.लि. थोड़ा गरम पानी में मिलाके दीजिये।

संचय:
१. खरपतवारनाशक के डब्बों को अलग कमरे में रखिये तथा अन्य पदार्थों के रखनेवाली जगह से दूर रखिये। खरपतवारनाशक की संख्या तथा प्रकृती के हिसाब से अलग तालाबन्ध अलमारी में रखिये।
२. खरपतवारनाशक रखनेवाला कमरा या जगह, सूखी हवादार मजबूत बनावट, रोशनीदार तथा बड़े आकारवाला होना चाहिये ताकी वातावरण दूषित न हो।

खाली डब्बों का नष्टीकरण
१. खाली डब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहनेवाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन मे गाढ़ दिजीये।
२. खाली डब्बों को बाहर मत रखिये ताकी दुबारा इस्तेमाल न हो सके।
३. डिब्बे, बचा हुआ खरपतवारनाशक तथा सफाईवाले पदार्थों को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकी वातावरण या पानी दूषित न हो।

रचना: ओक्सिफ्लोरफेन टेक्निकल (७०% स. त.) २३.५% ई सी, बनाने के लिए : ३३.६०% व/व, झायलिन : ४२.८०% व/व, सायक्लोहेक्सानॉन : १३.४०% व/व, इमल्सीफाइड ब्लॅंड (कैल्शियम डोडेसाइल)-बेन्जीन सल्फोनेट, ओपीई – ७०, आईएफ – १०० और टेर्गिटॉन एक्सडी : १०.२०% व/व, **कुल : १००% व/व.**

Hindi

ऑक्झीफ्लोरफेन २३.५% ई सी

ओव्हरटेक (तणनाशक)

ओव्हरटेक २३.५ ई सी ऑक्झीफ्लोरफेन सक्रीय घट २३.५% व/व समतोल इमल्सीफीयेर आणि सॉल्वेन्ट्स यांनी युक्त असलेलं निवडक तणनाशक आहे. ह्याच्या दिर्घकाळ काम करण्याच्या क्रियेमुळे भात, चहा, बटाटा, कांदा आणि भुईमुग ह्या पीकां मधील तण नियंत्रीत होते.

योगासाठी शिफारस :

पिक	तण / रानगवत	प्रति हेक्टर प्रमाण			वापरण्याची वेळ	मध्यंतर कालावधी मागील फवारणी व हंगाम वामधील अंतर (दिवस)
		अे.आय. (ग्रॅम)	फॉर्म्युला (मि.ली.)	पाणी (लीटर)		
भात (थेट पेरणी लावण्या पूर्वी)	लालदांडी, लव्हाळा, इक्लिप्टा अल्वा	१५०-२४०	६५० ते १०००	५००	रोपणीनंतर ४ दिवसाच्या आत वापर करा.	१५ दिन
चाय	डिजिटेरिया इम्पेरटा, पास्पलम, बोरीरिया, हिस्पिडा	१५० से २५०	६५० से १०००	५०० से ७५०	तण उगवण्यापूर्वी रांगे मधे एकसमान फवारणी करा	
बटाटा	चेनोपोडियम, कोरोनोपास लव्हाळा, हेलीओट्रोपियम, ट्रिन्थेमा	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	तण उगवण्यापूर्वी रांगे मधे एकसमान फवारणी करा	
कांदा	चेनोपोडियम, माठ	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५	तण उगवण्यापूर्वी रांगे मधे एकसमान फवारणी करा	
भुईमूग	लालदांडी डिजिटेरिया, आर्गिनाटा	१०० से २००	४२५ से ८५०	५०० से ७५०	तण उगवण्यापूर्वी रांगे मधे एकसमान फवारणी करा	

वापरण्यासाठी साधनं :
हातानं चालविता येणारा नॅपसॅक स्प्रेयर-फ्लडजेट किंवा साध्या फ्लॅट फॅन नोजल सहित शिफारस करण्यात येत आहे. स्प्रेयर असलेला ट्रॅक्टरही उपयोगात आणला जाऊ शकतो.

विषबाधा लक्षण :
संपर्क झाल्यास एकत्रित किंवा खालीलपैकी कोणतही विष लक्षण दिसू शकतं. उदाहरणार्थ - डोकेदुखी, मळमळ, त्वचा व डोळ्यांची जळजळ.

प्रथमोपचार :
त्वचा बाधित झाल्यास पुष्कळ पाणी आणि साबणानं धुवा. डोळे जळजळू लागल्यास स्वच्छ पाण्यानं धुवा.

विषबाधा निवारक उपाय :
लक्षणानुसार उपचार करा. पोटात आत गेल्यास गरम पाण्यातून गॅस्ट्रिक लॅव्हेज द्यावं आणि नंतर चारकोल २ भाग, मॅग्नेशियम ऑक्साईड १ भाग आणि टॅनिक ॲसिड १ भाग यांचं मिश्रण ३०० मि.ली. गरम पाण्यातून द्यावं.

साठा :
१) तणनिवारक औषधाचा साठा स्वतंत्र खोलीत-आवारात करावा किंवा अन्य वस्तू ठेवलेल्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर असावा, औषधाचं प्रमाण व स्वरूप विचार घेऊन त्याप्रमाणे स्वतंत्र कुलुप-किल्ल्या असलेल्या कपाटांमध्ये साठा करावा.
२) तणनिवारक औषध ठेवण्याची खोली किंवा आवार मजबूत बांधकाम केलेली, कोरडी, खेळती हवा असलेली, प्रशस्त आणि पाण्यापासून धोका नसलेली असावी.

कंटेनर्स नष्ट करणं :
१) पॅकेजिंग सामुग्री मोडून वस्तीपासून दूर पूरावी.
२) दुरुपयोग होऊ नये म्हणून उपयोगात आणलेली सर्व साधन सामुग्री हलगर्जीपणे बाहेर टाकू किंवा ठेवू नयेत.
३) पॅकेज किंवा जादा सामुग्री आणि धुवावयाच्या वस्तु योग्य सुरक्षित पद्धतीनं नष्ट कराव्या, की जेणेकरुन पर्यावरण रक्षण होईल आणि जलप्रदूषण होणार नाही.

मिश्रण: ऑक्झीफ्लोरफेन तांत्रिक (70% स. घ.) 23.5% ई सी, तयार करण्यासाठी : 33.60% व/व, झायलिन : 42.80% व/व, सायक्लोहेक्सानन : 13.40% व/व, फेसाळ मिश्रण (कॅल्शियम डोडेसिल) - बेन्झिन सल्फोनेट, ओपीई-70, आयएफ -100 आणि टर्जिटन एक्सडी : 10.20% व/व, **एकूण १००.००% व/व.**

Marathi

...सैक्ळोहेक्सानोन्:13.40% w/w, एमल्सि... கலவை (கால்சியம் டாடெகைல்) - பென்ஸீன் சல்ஃபோனேட், ஓபிஈ-70, ஐஎஃப்-100 மற்றும் டெர்கிடான் எக்ஸ்டி : 10.20 % w/w, மொத்தம் 100.00% w/w

TAMIL

42.80% ಡಬ್ಲ್ಯ/ಡಬ್ಲ್ಯ, ಸೈಕ್ಲೊಹೆಕ್ಸನೋನ್ : 13.40% ಡಬ್ಲ್ಯ/ಡಬ್ಲ್ಯ, ಇಮಲ್ಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ (ಕಾಲ್ಷಿಯಂ ಡೊಡೆಸಿಲ್)- ಬೆನ್‌ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್, ಒಪಿಇ-70, ಐಎಫ್-100 ಮತ್ತು ಟೆರ್ಗಿಟೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಡಿ : 10.20% ಡಬ್ಲ್ಯ/ಡಬ್ಲ್ಯ, ಒಟ್ಟು 100.00% ಡಬ್ಲ್ಯ/ಡಬ್ಲ್ಯ

KANNADA

ਜ਼ਾਈਲੀਨ: 42.80% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ, ਸਾਈਕਲੋਹੇਕਸਾਨਨ : 13.40% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ, ਈਮਲਸੀਫਾਈ ਬਲੈਂਡ (ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਡੋਡੇਸਾਈਲ) – ਬੇਨਜ਼ੇਨ ਸਲਫੋਨੇਟ, ਓਪੀਈ-70, ਆਈਏਫ-100 ਅਤੇ ਟਰਗੁਟੋਨ ਏਕਸਡੀ: 10.20% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ, ਕੁਲ: 100.00% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ

PUNJABI

ORIYA

ASSAMESE

URDU

Gujarati

BENGALI

TELUGU

ഓക്സിഫ്ലൂർഫെൻ 23.5% ഇസി

ഓവർടേക്ക് (കളനാശിനി)

ഓവർടേക്ക് 23.5% ഇ സി ഒരു സെലക്റ്റീവ് കളനാശിനിയാണ്.

MALAYALAM